

Récapitulatif

Réactions vaccinales : comment les limiter

Réactions Systémiques

- Chute "sous la seringue"
- Tremblements
- Abattement, Respiration Difficile, Hypotension, Tachycardie
- Fièvre
- Mort (peu fréquent)

Réactions à la vaccination

Réactions Locales

- Oedème, Induration, Sensibilité Douloreuse, Rougeur, Chaleur, Nécrose
- Abcès

Préparation

- * Porc en bonne santé
- * En période de fortes chaleurs, décaler la séance
- * Ajeunement des animaux
- * Mise à température des vaccins (25-30°C)
- * +- Distribution d'anti-pyrétique oral

Limiter les réactions vaccinales

Techniques d'Injection

- * Approche calme et douce
- * Utilisation d'aiguilles fines
- * Injection dans une zone propre
- * Injection lente (pour injecter 2ml, compter 3sec)
- * Changement régulier d'aiguille (1/reproducteur, 1/12-15 porcelets)

Hygiène

- * Changement de prolongateur à chaque séance
- * Nettoyage du matériel après chaque séance
- * Stockage des seringues à l'abri de la lumière et de la poussière, voire au frigo

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire.

Et pour aller plus loin, il est possible de réaliser un audit pour valider les bonnes pratiques vaccinales dans votre élevage.

